

*Die patiënt met amyloïdose kan ook zo maar vlak voor ú zitten.*

**Vermoeden van amyloïde polyneuropathie?**

**In deze neuromusculaire referentiecentra kunt u terecht voor specialistisch advies.**

**UZ Brussel**

T 02/476 32 94

E sara.bare@uzbrussel.be

**UZ Gent**

T 09/332 62 29

E secretariaatnmmc@uzgent.be

**UCL Saint-Luc**

T 02/764 13 11

E bnmdr@uclouvain.be

**Erasmie ziekenhuis**

T 02/555 81 25

E secmed.neuro@erasme.ulb.ac.be

**UZ Leuven**

T 01/634 35 08

E nmmc@uzleuven.be

**CHR de la Citadelle**

T 04/225 69 82

E alain.maertens@chrcitadelle.b

**UZ Antwerpen**

T 03/821 45 08

E iris.smouts@uza.be



Pleinlaan 17, 1050 Elsene, België

190806 / SEP 2019

*Je herkent nog eerder een haas en een eend dan een patiënt met amyloïdose.*



Kijk op [amyloidose.be](http://amyloidose.be)



*Hoe een amyloïdosepatiënt  
zich vóór uw neus verstoopt.*

*AMYLOÏDOSE is*

*subtiel*

*s l u i p e n d*

*VEELHEID aan klachten*

*meer  
meer  
meer  
meer  
meer  
meer  
meer  
meer  
meer  
meer*  
*meerdere organen*

*VAAG en DIVERS*

Amyloïdose is de naam van een groep stapelingsziekten van verkeerd gevouwen eiwitten die in de vorm van amyloïd fibrillen kunnen neerslaan in allerlei organen. Deze fibrillen kunnen niet worden afgebroken en dit leidt tot amyloid stapeling in weefsels of organen zoals de nieren, hart, lever, maagdarmkanaal en zenuwen. De drie meest voorkomende vormen van amyloïdose zijn AL amyloïdose, AA amyloïdose en ATTR amyloïdose.

Deze stapeling van fibrillen tussen de cellen in de weefsels leidt tot een gestoorde werking van organen. Van ongeveer een dertigtal eiwitten is bekend dat zij kunnen leiden tot amyloïdose. Het type eiwit dat leidt tot amyloïd wordt het voorlopereiwit genoemd, en deze bepaalt hiermee het type amyloïdose. Zo wordt AL veroorzaakt door ontsparing van lichte keten eiwitten.

AA kan zich ontwikkelen door een langdurige infectie of ontsteking wat een verhoogde concentratie serum amyloid A eiwit (SAA) kan veroorzaken. Verkeerd gevouwen TransThyRetine is de onderliggende oorzaak van ATTR amyloïdose. **Er is geen direct, duidelijk symptoomcomplex voor amyloïdose:** type eiwit en locatie bepalen de symptomen. De diagnose wordt nog makkelijk gemist, terwijl het steeds beter behandelbaar is. **Leer meer op [amyloidose.be](http://amyloidose.be)**

Amyloïdose is steeds beter behandelbaar, maar als diagnose nog steeds gemakkelijk gemist.  
Zoek mee en kijk op [AMYLOIDOSE.BE](http://AMYLOIDOSE.BE)